



topeX FOL

CALCIO BORO ZINC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO)	140 g/lit
Boro (B)	10 g/lit
Zinc (Zn)	70 g/lit
Molibdeno(Mo)	52 mg/lit
Cobalto (Co)	13 mg/lit
Vitaminas C y E	2.6 g/lit
Azufre (Z)	2.0 %
Cobre (Cu)	0.05%
Hierro (Fe)	0.10%
Magnesio (Mg)	0.50%
Manganeso (Mn)	0.05%
Acido Húmico	10%

GENERALIDADES

TOPEX FOL.- Es un fertilizante foliar líquido totalmente asimilable a través de las hojas y tallos verdes, enriquecido con Calcio, Boro, Zinc; microelementos quelatizados. Previene y corrige deficiencias de Calcio, Boro y Zinc especialmente en el período de cuajado y fructificación. Recomendado en hortalizas, frutales, menestras, algodón, papa, tomate, ají, pimiento, sandilla, zapallo etc.

MECANISMO DE ACCIÓN

TOPEX FOL Pone a disposición de la planta Calcio, Boro y Zinc; activos y asimilables.

Reduce la aparición de carencias de Calcio, Boro y Zinc producidas por condiciones ambientales adversas (estrés hídrico, salinidad, etc.)

Evita la caída de flores y frutos, controlando el crecimiento retardado de los brotes, promoviendo el crecimiento celular, evitando el arrosado y muerte de las yemas.

MODO DE ACCIÓN

El Calcio ayuda al crecimiento de la planta, aumentando la energía, acelera también el flujo de nutrientes hacia la célula y fuera de ella, conforma en las paredes celulares los pectatos de Calcio. Activa las funciones catalíticas y neutraliza por precipitación algunos ácidos orgánicos.

El Boro es esencial en el metabolismo del nitrógeno y los carbohidratos.

COMPATIBILIDAD

TOPEX FOL es compatible con todos los plaguicidas de uso común.

En mezclas con fertilizantes a base de fósforo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

Se aplica cuando las plantas tengan suficiente follaje y durante toda la etapa de crecimiento vegetativo.

CULTIVOS	DOSIS EN 200 lts.	MOMENTOS DE APLICACIÓN
PAPA, CAMOTE, YUCA	0.5 - 1	Antes de la floración y durante la tuberización
ALGODON	0.5 - 1	Prefloración y aplicar cada 20 días
TOMATE, PIMIENTO, AJÍ	0.5 - 1	A 5-7 días después del trasplante, al desahije antes de floración y al crecimiento del fruto
SANDIA, MELON, ZAPALLO	0.5 - 1	A 3-7 días después del trasplante, al desahije, en prefloración y otra en fructificación
HORTALIZAS, APIO, BROCOLI	0.5 - 1	Después del trasplante aplicar cada 20 días
COL, BROCOLI, COLIFLOR	0.5 - 1	A 10 días del trasplante, al inicio de formación de cabeza
CITRICOS, MANZANO, PALTO, MANGO, DURAZNO	0.5 - 1	A 5-7 días después del trasplante, al desahije en prefloración y durante el crecimiento del fruto
ARROZ, TRIGO, CEBADA	0.5 - 1	Antes del espigado y al llenado del grano
VID	0.5 - 1	Al trasplante, al crecimiento en prefloración y crecimiento del fruto
FRIJOL, ARVEJA, HABA, PALLAR, etc.	0.5 - 1	En prefloración y al inicio de crecimiento de vaina
FRESA	0.5 - 1	A la primera semana del trasplante, en prefloración y otra al crecimiento del fruto
MAIZ	0.5 - 1	A los 25 días repetir cada 20 días
ALFALFA	0.5 - 1	Después del corte luego cada 15 días

COMPATIBILIDAD

TOPEX FOL es compatible con todos los plaguicidas de uso común.

En mezclas con fertilizantes a base de fósforo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.



Presentación

1L, 5L, 20L, 200L





Abel Zela Mz.S Lt.2c Urb. Villa del Sol
Los Olivos- Teléfono +51-3414034
LIMA PERÚ

FICHA TÉCNICA "TOPEXFOL CABZINC"

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA:

EMPRESA: Agricor Perú Company S.A.C.

PRODUCTO: topexfol Ca-B-Zn -Nutriente foliar líquido

II.- INGREDIENTES ACTIVOS: (m/v)

Calcio (CaO).....	140 g/lit
Boro (B).....	10 g/lit
Zinc (Zn).....	70 g/lit
Molibdeno(Mo).....	52 mg/lit
Cobalto (Co).....	13 mg/lit
Vitaminas C y E.....	2.6 g/lit
Azufre (Z).....	2.0 %
Cobre (Cu).....	0.05%
Hierro (Fe).....	0.10%
Magnesio (Mg).....	0.50%
Manganeso (Mn).....	0.05%
Acido Húmico.....	10 %

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Estado Físico: Suspensión Concentrada

Color: Marrón Oscuro

Olor: Característico

Densidad (gr/ml) a 20 °C 1.30+/-0.1 **PH** 5.4+/-0.2

Solubilidad en agua: Soluble

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años **IV.-**

FORMULACIÓN: Concentrado Soluble.

V.- MODO DE ACCION: Los componentes Quelatizados de **TOPEXFOL Calcio-Boro-Zinc** actúan directamente sobre las plantas, el Calcio metabolizado da lugar a paredes celulares fuertes de las flores y frutos con mayor fortaleza; el Boro también cumple un papel importante en el transporte de azúcares y almidones de las hojas hacia los frutos. Ambos elementos son indispensables en las etapas de llenado de frutos y bulbos, lo que origina una mejor calidad de frutos cosechado.

TOPEXFOL Calcio-Boro-Zinc evita la caída de flores y frutos.

VI.- RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica cuando la planta tenga suficiente follaje y durante toda la etapa de crecimiento vegetativo.

CULTIVOS	DOSIS EN 200 lts.	MOMENTOS DE APLICACIÓN
PAPA, CAMOTE, YUCA	0.5 - 1	Antes de la floración y durante la tuberización
ALGODON	0.5 - 1	Prefloración y aplicar cada 20 días
TOMATE, PIMIENTO, AJI	0.5 - 1	A 5-7 días después del trasplante, al desahije antes de floración y al crecimiento del fruto
SANDIA, MELON, ZAPALLO	0.5 - 1	A 3-7 días después del trasplante, al desahije, en prefloración y otra en fructificación
HORTALIZAS, APIO, BROCOLI	0.5 - 1	Después del trasplante aplicar cada 20 días
COL, BROCOLI, COLIFLOR	0.5 - 1	A 10 días del trasplante, al inicio de formación de cabeza
CITRICOS, MANZANO, PALTO, MANGO DURAZNO	0.5 - 1	A 5-7 días después del trasplante, al desahije en prefloración y durante el crecimiento del fruto
ARROZ, TRIGO, CEBADA	0.5 - 1	Antes del espigado y al llenado del grano
VID	0.5 - 1	Al trasplante ,al crecimiento en prefloración y crecimiento del fruto
FRIJOL, ARVEJA, HABA, PALLAR, etc.	0.5 - 1	En prefloración y al inicio de crecimiento de vaina
FRESA	0.5 - 1	A la primera semana del trasplante, en prefloración y otra al crecimiento del fruto
MAIZ	0.5 - 1	A los 25 días repetir cada 20 días
ALFALFA	0.5 - 1	Después del corte luego cada 15 días

VI.- COMPATIBILIDAD:

TOPEXFOL Calcio-Boro-Zinc Es compatible con todos los plaguicidas del uso común.

En mezclas con fertilizantes a base de fósforo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN: aplicarse en los cultivos según recomendaciones

TOPEXFOL Calcio-Boro-Zinc puede

de la etiqueta comercial, sin embargo, de modo general su uso es antes de la floración y luego del cuajado de los frutos.

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar líquido.

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD AGRICOR PERU COMPANY S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA **TOPEXFOL Calcio-Boro-Zinc** es un fertilizante foliar muy seguro, pero por norma de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

Editado: Ficha Técnica / TOPEXFOL Calcio-Boro-Zinc
04.12.25

HOJA DE SEGURIDAD TOPEXFOL CABZINC

“TOPEXFOL CABZINC”

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA:

EMPRESA: Agricor Perú Company S.A.C.

PRODUCTO: TOPEXFOL – Fertilizante Líquido

- Uso: Fertilizante de aplicación foliar.
- Formulado por: Agricor Perú Company S.A.C
- Dirección: Av. Abel Zela Mz. S Lt.C Urb. Villa del Sol Los Olivos Lima Perú .
- Teléfono: (511) 6364479
- E-mail: agricorperucompany@gmail.com

II. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Calcio (CaO).....	140 g/lit
Boro (B).....	10 g/lit
Zinc (Zn).....	70 g/lit
Molibdeno(Mo).....	52 mg/lit
Cobalto (Co).....	13 mg/lit
Vitaminas C y E.....	2.6 g/lit
Azufre (Z).....	2.0 %
Cobre (Cu).....	0.05%
Hierro (Fe).....	0.10%
Magnesio (Mg).....	0.50%
Manganeso (Mn).....	0.05%
Acido Húmico.....	10 %

III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. Peligros para la salud **TOPEXFOL CABZINC** es un fertilizante líquido con un buen contenido de Calcio (Ca) y Boro (B), y Zinc que no reviste peligro en su uso y manejo, no tiene ningún efecto a la piel o por inhalación. Puede ser ligeramente tóxico si se ingiere cantidades apreciables.

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si hubiera contacto con los ojos como consecuencia de su manipulación, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos abriendo los párpados con los dedos y enjuague bien, igualmente si hay contacto con la piel. Si se ingiere, dar de beber abundante agua, estando la persona consciente, repetir las veces que sean necesarias.

IXI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA TOPEXFOL CABZINC, es un fertilizante no tóxico para los seres humanos y/o animales. No aplica información toxicológica alguna.

XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

TOPEXFOL CABZINC, es un fertilizante muy seguro, con riesgo muy bajo o escaso al ecosistema, por lo tanto, siguiendo las instrucciones de las buenas prácticas de fertilización, no debería de haber problema alguno al medio ambiente.

XIII. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

En caso se hubiera producido algún derrame de TOPEXFOL CABZINC, deberá procederse como lo indica el punto referido a medidas para escape accidental.

XIV. INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE

Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar derrames, no apiñe ni transporte en un número mayor de cajas que puedan soportar para evitar justamente su posible rompimiento.

XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Clasificación: Fertilizante líquido para uso foliar. Tipo de formulación: Líquido. Frases de riesgo: Ninguna.

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL El fertilizante TOPEXFOL CABZINC es un fertilizante para ser aplicado Por vía foliar, que aporta Calcio y Boro y Zinc para los cultivos; propiedad y marca registrada por la empresa AGRICOR PERU COMPANY S.A.C., por lo que ésta no se hace responsable del mal uso que se haga del mismo.

Editado: 05.10.25